

Chirurgie
040 286 4872

Je chirurg heeft met je besproken, dat binnenkort bij jou een schildwachtklieeronderzoek en -verwijdering (biopsie) plaatsvindt. In deze informatie lees je hier meer over.

Wat is een schildwachtklieeronderzoek

Met behulp van een kleine hoeveel radioactieve stof sporen we je schildwachtklier (de eerste lymfeklier) op.

Waar vindt de procedure plaats

Het schildwachtklieeronderzoek vindt plaats op de **afdeling radiologie**, souterrain, **route 22**. De procedure wordt verdeeld over twee dagen: De dag voorafgaand aan de ingreep en op de ochtend van de ingreep zelf.

Wat is belangrijk te weten voor de procedure

Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt mag je deze normaal blijven innemen.

Als je bloedverduunners gebruikt moet je dit melden aan je behandelend specialist. Het kan zijn dat deze beslist dat je tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen.

Kleding

Voor de procedure is het nodig dat je het bovenlichaam ontkleedt. Wij raden je aan je sieraden thuis te laten

Hoe verloopt de procedure

Dag 1

Op de afdeling radiologie krijg je een kleine hoeveelheid radioactieve stof rond de tumor in de borst gespoten door de radioloog. Dit gebeurt met twee injecties. Vervolgens krijg je een derde injectie in de rand van de tepelhof. De inspuiting kan in de borst een branderig gevoel geven en in via lymfevaatjes naar de lymfeklieren in de oksel. Deze inspuiting duurt 15 minuten.

Masseren

Terug op de afdeling/thuis is het belangrijk dat je ongeveer ieder uur de borst rondom de injectieplaatsen gedurende ± 1 minuut masseert en eventueel warm houdt. Je doet dit de avond van de inspuiting, totdat je naar bed gaat. Je krijgt hierover uitleg op de afdeling radiologie.

Dag 2

Op de ochtend van de operatie word je vanuit de afdeling, gekleed in operatiekleding, naar de afdeling radiologie gebracht.

De radioactieve stof is inmiddels opgenomen door de lymfeklier(en) in de oksel. Met behulp van opnamen wordt de schildwachtklier in beeld gebracht zodat deze met een waterproof stift op de huid kan worden gemarkeerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Hierna word je naar de operatiekamer gebracht.

Wat gebeurt er tijdens operatie

Na het maken van de foto's ga je naar de operatiekamer.

Infuus

Tijdens de operatie krijg je vocht via een infuus in je arm toegediend.

De operatie

Tijdens de operatie spuit de chirurg een kleine hoeveelheid blauwe kleurstof rondom de tepelhof in.

Deze kleurstof volgt dezelfde route als de radioactieve stof en wordt gebruikt als extra controle om de schildwachtklier op te sporen. De schildwachtklier (soms is dit er meer dan één) wordt onder algehele narcose operatief uit de oksel verwijderd (biopsie), via een kleine snee, op de plaats van de radioactiviteit. Vervolgens wordt de huid onderhuids gehecht.

De patholoog onderzoekt de verwijderde schildwachtklier op de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen.

Wat gebeurt er na operatie

Infuus

Het infuus wordt verwijderd als je op de afdeling bent en je gedronken en geplast hebt en niet (meer) misselijk bent.

De kleurstof

De kleurstof die tijdens de operatie wordt ingespoten laat blauwe sporen achter op de huid rondom het gebied waar het is ingespoten. Het kan weken duren voordat deze verkleuring is verdwenen. Ter plekke is het mogelijk dat de huid iets blauwer blijft. Je gezicht kan op de operatiedag door de kleurstof grauw van kleur zijn. Je urine en ontlasting kunnen tijdelijk groen van kleur zijn. Er wordt slechts een geringe hoeveelheid radioactieve stof bij het onderzoek ingespoten. Deze vormt geen gevaar voor jou en je omgeving. Na enkele dagen is deze stof uit je lichaam verdwenen.

Wondvocht

In het operatiegebied kan een ophoping van wondvocht (seroom) ontstaan. Dit is niet verontrustend, maar kan wel vervelend zijn. Dit wondvocht wordt na enkele dagen tot weken geleidelijk aan minder.

Ontslag

Bij ontslag krijg je een afspraak mee bij je chirurg en de mammacare verpleegkundige, 7 - 10 dagen na de operatie. Tijdens deze afspraak wordt je borst/wond gecontroleerd en krijg je de uitslag van het weefsel dat onderzocht is door de patholoog.

De uitslag en informatie over nabehandelingen

Neem iemand mee

Breng zo mogelijk één van je naasten mee naar de afspraak, waarin je duidelijkheid krijgt over de uitslag. Dit kan je helpen om thuis ook over je ziekte en behandeling te praten.

De uitslag

De verwijderde schildwachtklier wordt microscopisch onderzocht door een patholoog. Na 7 - 10 dagen is de uitslag hiervan meestal bekend en wordt deze besproken in een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit de chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog.

Nabehandelingen

In het multidisciplinaire team wordt ook besproken welke aanvullende nabehandelingen voor jou het beste zouden zijn. Het kan gaan om de volgende behandelingen:

- bestraling (radiotherapie)
- hormonale therapie
- chemotherapie
- immunotherapie

Je behandelend chirurg en mammacare verpleegkundige bespreken dit, zo nodig, met je bij de uitslag.

Mogelijke complicaties

Nabloeding

Bij elke ingreep bestaat de kans op een complicatie. Bij deze ingreep is de kans op een nabloeding zeer gering.

Infectie

Bij de schildwachtklieroperatie bestaat een kleine kans op een infectie. Dit uit zich in roodheid rondom het operatiegebied, temperatuursverhoging en zwelling. Meestal is een antibioticakuur dan noodzakelijk.

Welke leefregels zijn van toepassing Bewegen en belasten

- De eerste week na de operatie mag je je arm niet te zwaar belasten, maximaal 1 kg.
- Het onbelast bewegen van de arm is wel erg belangrijk.
- Fietsen mag na 1 week.
- Intensief sporten mag na 2 weken.
- Verder mag je alles doen, al is het beter geen zware lichamelijke arbeid te verrichten tot aan het eerste polikliniekbezoek.

Andere richtlijnen

- Je mag vanaf dag 1 douchen met doucheschuim/shampoo.
- Na 3 weken mag je in bad en/of zwemmen.
- Na 2 weken mag je deodorant gebruiken als de wond gesloten is.
- Je oksel 2 weken niet ontharen.
- Bij pijn kun je tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol 500 mg. innemen.
- Om je wond te verzorgen, kun je de wond verbinden met een steriel gaasje. Dit niet is noodzakelijk.

Wanneer moet je contact opnemen

Je moet contact opnemen bij:

- temperatuurstijging boven 38,5° C die langer dan 24 uur duurt;
- toenemende roodheid of zwelling van het wondgebied;
- toenemende vochtophoping, mogelijk met pijn en bewegingsbeperking;
- lekkage vocht/bloed uit de wond en hevige pijn.

Tijdens kantooruren kun je contact opnemen met:
de **polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 72.**

Vraag dan naar de mammacare verpleegkundige, de verpleegkundig specialist of de chirurg.

Tijdens het **telefonisch spreekuur** kun je contact opnemen met de mammacare verpleegkundige. Voor tijden en telefoonnummer zie folder "*Mammacare verpleegkundige*". Bij geen gehoor kun je bellen met de polikliniek chirurgie.

Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de **afdeling spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34.**

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/chi073-schildwachtklieronderzoek-en-verwijdering-bij-borstkanker/
Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.



CHI073
11-01-2017