

Pijnbestrijding  
040 286 4861

In overleg met jouw pijnspecialist heb je gekozen voor een stellatumblokkade. In deze informatie lees je wat de behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

### **Wat is een stellatumblokkade**

Een stellatumblokkade is een onderbreking van een zenuwknoopje (ganglion stellatum) in de hals. Dit is een gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel.

Een stellatumblokkade kan zinvol zijn bij de volgende pijnklachten:

- zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouders, borst, arm en hand;
- bepaalde soorten hoofdpijn;
- temperatuursverschil of overmatige transpiratie in arm of hand;
- sympathische reflexdystrofie van de arm.

De arts probeert eerst door proefblokkades vast te stellen welke zenuw de pijn beïnvloedt. Als de proefbehandeling een positief resultaat geeft wordt een definitieve behandeling gedaan.

### **Vorbereiding**

- Regel iemand die je na de behandeling naar huis begeleidt.
- De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als je zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
- Gebruik je bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. Je krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
- Geef ook eventuele allergieën door aan de arts.

### **De behandeling**

Je ligt tijdens de behandeling op jouw rug. De plaats van de behandeling wordt bepaald en afgetekend. De huid wordt plaatselijk verdoofd met een injector. Dit is een soort pistooltje waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gespoten.

De arts geeft een plaatselijke verdoving. Je krijgt daarvoor een prik in de hals. Het zenuwknoopje wordt onder röntgendoorlichting opgezocht en vervolgens behandeld. Op de plaats waar je geprikt bent krijg je een pleister of gaasje.

### **Na de behandeling**

- Na de behandeling ga je met jouw begeleider naar huis. Indien nodig kan jouw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen. Na een nekbehandeling kun je namelijk wat duizelig zijn.
- Na de behandeling kun je niet zelf autorijden of met het openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). Dit geldt alleen voor de dag van de behandeling.
- De pleister mag 's avonds worden verwijderd.

### **Bijwerkingen en complicaties**

Ernstige complicaties komen zelden voor. Direct na een blokkade kunnen de volgende bijwerkingen optreden: bloeduitstorting, heesheid, slikklachten, loopneus, hangend ooglid of wazig zien. Dit is maar tijdelijk.

## Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61. Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar  
[www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/pij018-stellatumblokkade/](http://www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/pij018-stellatumblokkade/)

Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.



PIJ018  
08-01-2019